

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**Mucolysin® Skovbær 200 mg, brusetabletter**
Acetylcystein**Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.**

Du kan få Mucolysin Skovbær uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Mucolysin Skovbær.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Mucolysin Skovbærs virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin Skovbær
3. Sådan skal du tage Mucolysin Skovbær
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Mucolysin Skovbær
6. Yderligere oplysninger

1. MUCOLYSIN SKOVBÆRS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Mucolysin Skovbær tilhører en lægemiddelgruppe som kaldes mucolytika.

Mucolysin Skovbær virker ved at gøre sejt slim i lungerne og luftvejene mere tyndtflydende og derved lette hosten.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Mucolysin Skovbær for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MUCOLYSIN SKOVBÆR**Tag ikke Mucolysin Skovbær**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du for nylig har hostet blod op.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mucolysin Skovbær

- hvis du har astma eller tidligere har haft åndedrætsbesvær (bronkospasmer).
- hvis du har eller har haft mavesår.

Brug af anden medicin

Anden medicin kan påvirke virkningen af Mucolysin Skovbær, og/eller Mucolysin Skovbær kan påvirke behandlingen med anden medicin. Dette gælder især:

Antibiotika, som f.eks. cefalexin. Bør tages ca. 1-2 timer før eller efter indtagelse af Mucolysin Skovbær.

Andre typer antibiotika, som amoxicillin, doxycyclin, erythromycin og bacampicillin påvirkes ikke af Mucolysin Skovbær.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Mucolysin Skovbær sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucolysin Skovbær i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Mucolysin Skovbær efter aftale med din læge.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Mucolysin Skovbær efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucolysin Skovbær påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mucolysin Skovbær

Mucolysin Skovbær indeholder 131 mg natrium pr. dosis (tablet). Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MUCOLYSIN SKOVBÆR

Hvis din læge har ordineret Mucolysin Skovbær til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosering er:

Voksne:

1 brusetablet (200 mg) 3 gange daglig.

Børn over 5 år:

1 brusetablet (200 mg) 2 gange daglig.

Bør ikke anvendes til børn under 5 år uden lægens anvisning.

Brusetabletterne opløses i et ½ glas vand.

Hvis du har taget for mange Mucolysin Skovbær

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin Skovbær, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Mucolysin Skovbær


Hvis du har glemt en dosis Mucolysin Skovbær, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Mucolysin Skovbær, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Mucolysin Skovbær

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Mucolysin Skovbær kan, som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mucolysin® and  **SANDOZ** are registered trademarks of Novartis.

Alvorlige bivirkninger**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Bronkospasme, som er en sammentrækning af de små luftrør i lungerne, hvilket medfører en besværet pibende vejrtrækning.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:**Meget almindelige bivirkninger** (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme, diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Mavesmerter.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Udslæt, kløe, nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. SÅDAN OPBEVARER DU MUCOLYSIN SKOVBÆR

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevar Mucolysin Skovbær i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt over for fugt.

Brug ikke Mucolysin Skovbær efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**Mucolysin Skovbær 200 mg indeholder:**

- Aktivt stof: Acetylcystein 200 mg
- Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, vandfri; natriumhydrogencarbonat; natriumcarbonat vandfri; ascorbinsyre; saccharinnatrium, natriumcyclamat; macrogol; brombæraroma og skovbæraroma.


Mucolysin Skovbærs udseende og pakningstørrelse**Udseende**

Hvid, rund tablet med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

Plastrør indeholdende 15, 25, 50 eller 100 brusetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Mucolysin® and  **SANDOZ** are registered trademarks of Novartis.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, C. F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 22. januar 2008