

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mucolysin® 600 mg, brusetabletter Acetylcystein

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Mucolysin uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Mucolysin.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden for nogle uger.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin
3. Sådan skal du tage Mucolysin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mucolysin er et slimløsende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Mucolysin for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MUCOLYSIN

Tag ikke Mucolysin:

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du for nylig har hostet blod op.

Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 14 år uden lægens anvisning

Vær ekstra forsigtig med at tage Mucolysin

- Hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer)
- Hvis du har eller har haft mavesår.

- Hvis du er særlig følsom over for histamin

Vær opmærksom på følgende:

Mucolysin kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Mucolysin.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge

- Hvis du både er i behandling med Mucolysin og visse antibiotika (f.eks. cephalixin og tetracyclin) bør du tage de to slags medicin med 2 timers mellemrum. Andre antibiotika, som f.eks. amoxicillin, doxycyclin, erythromycin, thiamphenicol og cefuroxim påvirkes ikke af Mucolysin.
- Hvis du tager hostestillende medicin.

Brug af Mucolysin sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucolysin sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du bør ikke tage Mucolysin, hvis du er gravid. Tal med lægen

Amning:

Du må ikke tage Mucolysin, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucolysin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mucolysin

Mucolysin indeholder sorbitol og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Mucolysin indeholder 138 mg natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MUCOLYSIN

Hvis din læge har ordineret Mucolysin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Brugsanvisning: Du skal opløse brusetabletten i et ½ glas vand.

Tag ikke Mucolysin sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op, hvilket kan forstyrre nattesøvnen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

½ brusetablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 brusetablet 1 gang daglig.

Børn over 14 år:

½ brusetablet (300 mg) 1 gang daglig.

Du må kun bruge Mucolysin til børn under 14 år efter aftale med en læge.

Hvis du har taget for mange Mucolysin brusetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Mucolysin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Mucolysin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Vejtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Mundbetændelse, mavesmerter, diarre, opkastning, halsbrand og kvalme,
- Hovedpine og feber.
- Overfølsomhedsreaktioner (Hududslæt og hævelser, kløe, nældefeber, åndenød, hurtig puls og nedsat blodtryk). Kan blive alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Susen for ørerne (tinnitus)

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted_ www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Mucolysin utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Mucolysin ved temperaturer over 30° C. Opbevar Mucolysin i original beholder, da det er følsomt for fugt.

Tag ikke Mucolysin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletter eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION

Mucolysin brusetabletter 600 mg indeholder:

Aktivt stof: Acetylcystein

Øvrige indholdsstoffer er: Citronsyre, vandfri; natriumhydrogencarbonat; natriumcarbonat, vandfri; mannitol; lactose, vandfri; askorbinsyre; saccharinnatrium (E954); natriumcyclamat (E952); natriumcitrat; brombærearoma "B": sorbitol; mannitol; gluconolacton; maltodextrin; silica, kolloid vandfri; skovbærearoma; vanillin; brombærearoma.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvide runde tabletter med delekærv på den ene side, en glat overflade og en duft af solbær.

Pakningsstørrelser

10 stk., 20 stk., 50 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39079 Barleben

Tyskland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 7. september 2011