

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mucolysin® 200 mg, brusetabletter

Acetylcystein

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Mucolysin uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Mucolysin

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden for nogle uger.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Mucolysins virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin
3. Sådan skal du tage Mucolysin
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Mucolysin
6. Yderligere oplysninger

1. Mucolysins virkning og hvad du skal bruge det til

Mucolysin er et slimløsende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Mucolysin for noget andet, skal du altid følge lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin

Tag ikke Mucolysin

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du for nylig har hostet blod op.

Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 5 år uden lægens anvisning.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mucolysin

- Hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer).
- Hvis du har eller har haft mavesår.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

- Der er ingen risiko ved at tage anden medicin samtidig med Mucolysin.
- Hvis du både er i behandling med Mucolysin og antibiotika bør du tage de to slags medicin med 1-2 timers mellemrum. Spørg din læge eller apoteket til råds, hvis du er i tvivl.

Brug af Mucolysin sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucolysin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Mucolysin efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Mucolysin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucolysin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mucolysin

Mucolysin indeholder sorbitol og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Mucolysin indeholder 99 mg natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. Sådan skal du tage Mucolysin

Hvis din læge har ordineret Mucolysin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Brugsanvisning: Du skal opløse brusetabletten i et ½ glas vand.

Tag ikke Mucolysin sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op. Det kan forstyrre nattesøvnen.

Voksne

1 brusetablet 3 gange daglig.

Børn over 5 år

1 brusetablet 2 gange daglig.

Du må kun bruge Mucolysin til børn under 5 år efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Mucolysin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Mucolysin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Mucolysin kan, som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlig åndenød.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme, diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Mavesmerter.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Udslæt, kløe, nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan også selv indberette bivirkningerne direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer du Mucolysin

Opbevar Mucolysin utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Mucolysin ved almindelig temperatur.

Brug ikke Mucolysin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Mucolysin 200 mg brusetabletter, indeholder:

Aktivt stof: Acetylcystein

Øvrige indholdsstoffer er: Natriumhydrogencarbonat; natriumcarbonat; citronsyre; saccharinnatrium (E 954); natriumcyclamat (E 952); natriumcitrat; mannitol; lactose, vandfri 75 mg; citronaroma; sorbitol; mannitol; gluconolacton; silica, kolloid vandfri og citrusolier.

Mucolysins udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Mucolysin er en rund og hvid brusetablet uden delekærv.

Pakningsstørrelser

25 stk., 50 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, C. F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ.

Fremstiller

Sandoz A/S, C. F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret: 18-12-2007